



LABORMITTEILUNG



Labormitteilung 02/2021 vom 29.01.2021

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Informationen bitte an die ausführenden Mitarbeiter*innen weiterleiten!

Ergänzend zur aktuellen UMMD intern vom 29.01.21 zum Thema „Intensivierte Testung von Patient*innen und Mitarbeiter*innen auf SARS-CoV-2“ möchten wir Ihnen die folgenden Handlungsanweisungen geben.

1. „Zusätzliche Antigen-Schnelltestung bei allen stationär aufzunehmenden Patienten sofort bei Aufnahme auf die Station und vor Einzug des Patienten in ein Mehrbettzimmer“

Beibehalten wird der standardmäßige kombinierte Rachen-Nasen-Abstrich für die PCR-Diagnostik, Auftragsanlage im ORDER-Entry mit Ein-sendung an das IMMB.

- **Zusätzlich** erfolgt ein trockener tiefer Nasenabstrich (Nasopharyngeal) für einen Antigen-Schnelltest.
Die Auftragsanlage erfolgt über das Order-Entry Zentrallabor/Infektionsserologie **SARS-CoV-2 Rapid Ag (Roche; Plaketten-Schnell-Test) und Einsendung an das Zentrallabor.**
Bitte kennzeichnen Sie den Auftrag mit „stationäre Aufnahme“.
Wir empfehlen den Transport zeitnah zu realisieren, da eine begrenzte Stabilität des Abstrichs im Trockentupfer vorliegt. Dies ist insbesondere eine Herausforderung für die Stationen, die nicht an die Rohrpost angebunden sind. Achten Sie bitte auf die geplanten Abholzeiten durch den Transportdienst!

Bitte verwenden Sie:

Trockentupfer, die Sie über das Zentrallabor anfordern können (13919) oder FLOQSwabs (Copan), Bestell.-Nr.: 1049476, und verbringen Sie diesen in ein steriles Röhrchen. Die häufig genutzten Röhrchen der Fa. Greiner (blaue Kappe) sind derzeit nur begrenzt verfügbar. Alternativ stehen Ihnen die Röhrchen für die Urinanalyse (Fa. BD, grau-braune Kappe) zur Verfügung.

Institut für Klinische Chemie
und Pathobiochemie
Labormedizin

OÄ. Dr. med. Katrin Borucki
Kommiss. Direktorin



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ML-13264-03-00
D-PL-13264-02-00

Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.
Leipziger Str. 44
39120 Magdeburg

Telefon: +49 391 67-13919
Telefax: +49 391 67-13902

ikcp@med.ovgu.de
www.ikc.ovgu.de

2. Zusätzliche Antigen-Schnelltestung bei allen stationären Patienten Tag 3 und Tag 6 nach Aufnahme:

Hier erfolgt ein kombinierter Rachen-Nasen-Abstrich (feucht, Amiesmedium). Die Auftragsanfrage erfolgt über das Order-Entry Zentrallabor/Infektionsserologie **SARS-CoV-2 Ag (Diasorin, feucht)** und Einsendung an das Zentrallabor.

Alternativ kann auch ein Trockenabstrich erfolgen (Nasenabstrich). Dies ist insbesondere möglich bei geringer Transportzeit (z.B. bei Anbindung an die Rohrpost). Dies ist auch verbunden mit einer Verkürzung der Analysezeit. Bitte wählen Sie dann folgende Anforderung aus: **SARS-CoV-2 Ag (Diasorin, trocken).**

Bitte markieren Sie den Auftrag mit „stationärer Patient Tag 3 / Tag 6“!

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die Routinetestungen an Tag 3 und 6 der Patienten in den Vormittagsstunden erfolgen sollten, um die Notfallkapazitäten im Spät- und Nachtdienst freizuhalten.

Profil	Zentrallabor Basisdiagnostik 13919	Zentrallabor Gerinnung 13919/ 13976	Zentrallabor Infektionsserologie 13919/ 800490	Zentrallabor Urin/Sondermat. 13919	Zentrallabor Funktionsteste Spez. Stoffwechselscreening 13982	Notf Univ 173
Rationelle Serologieanforderung		SARS-CoV-2-PCR-Schnelltest				
<input type="checkbox"/> Präoperative Infektionsserologie enthält Anti-HBc, HBsAg, Anti-HCV, HIV-Screening		<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 (PCR) Für ZNA, Notinterventionen bzw. nach Rücksprache. Kombinierten Nasen-Rachenabstrich mit flüssigem Medium verwenden.				
Hepatitis A		SARS-CoV-2-Antigen-Test				
<input type="checkbox"/> Anti HAV (total, qual.) <input checked="" type="checkbox"/> Anti HAV IgM		<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 Rapid Ag (Roche; Plaketten-Schnell-Test) Tiefer Nasenabstrich; Trockentupfer und steriles Röhrchen verwenden. Parallele Abnahme eines Nasstupfers für RT-PCR-Test (IMMB)				
Hepatitis B		<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 Ag (Diasorin, feucht) Rachen-Nasenabstrich (feucht) / Amiesmedium mit rosa Kapsel!				
<input checked="" type="checkbox"/> HBsAg <input checked="" type="checkbox"/> Anti HBs quant. <input type="checkbox"/> Anti HBc <input checked="" type="checkbox"/> Anti HBc IgM <input type="checkbox"/> Anti HBe		<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 Ag (Diasorin, trocken) Tiefer Nasenabstrich; Trockentupfer und steriles Röhrchen verwenden.				

Test bei stationärer Aufnahme

Test an Tag 3 und Tag 6

Es ist uns bewusst, dass das Management der Abstrichzuordnung am Anfang schwierig erscheint. Wir bitten Sie, fragen Sie uns bei Unklarheiten bereits vor der Auftragsanfrage.

Wir empfehlen Ihnen, die unter dem Punkt „Klinische Angaben“ formulierten Merkmale zur SARS-CoV-2-Testung zu nutzen, unabhängig davon welchen Test Sie anfordern für Patienten oder Mitarbeiter.

Dies führt zu einer schnelleren Abarbeitung, einer verbesserten Befundinterpretation als auch zu einer adäquaten Refinanzierung der Tests.

Bei Rückfragen oder Problemen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!

Wir sind erreichbar über:

IKCP- Hotline Tel: 13919/-12 oder 13940 bzw. über die Piepernummer 800490 sowie 800 487 und 800 485

Karin Borucki

Ltd. OÄ Dr. med. K. Borucki
Komm. Institutsleitung